

# **Ciclochem** crema

## **Ciclopirox olamina**

### **Composición**

Por 100 g: Ciclopirox olamina 1 g; Excipientes: Alcohol bencilico, Octildodecanol, Parafina líquida, Alcohol estearílico, Alcohol cetílico, Alcohol miristílico, Polisorbato 60, Estearato de sorbitán, Ácido láctico y Agua purificada.

### **Propiedades**

*Ciclochem* (ciclopirox olamina) es un antifúngico sintético dotado de un apreciable poder de penetración en la dermis, y que ha demostrado ser activo frente a "Tricophyton rubrum", "T. mentagrophytes", "Epidermophyton floccosum", "Microsporum canis", "Candida albicans" y "Malassezia furfur".

### **Indicaciones**

Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel y mucosas, tales como: Dermatofitosis, tinea pedis (pie de atleta), tinea cruris (eczema marginado de Hebra), y tinea corporis (herpes circinado). Candidiasis (moniliasis). Pitiriasis versicolor y Eritrasma.

### **Posología**

*Ciclochem* se aplicará sobre las superficies afectadas y su alrededor dos veces al día, mañana y noche.

La duración requerida de tratamiento es variable, dependiendo del agente etiológico y de la localización de la lesión. En general, los síntomas desaparecen tras la 1ª semana de tratamiento pero es conveniente continuar la terapéutica una o dos semanas más a fin de evitar las recidivas.

Los pacientes con "Pitiriasis versicolor" suelen presentar a las dos semanas de tratamiento una curación clínica, con eliminación del agente etiológico.

### **Normas para la correcta administración**

Efectuada la aplicación de *Ciclochem* se recomienda realizar un ligero masaje sobre la lesión.

### **Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al ciclopirox olamina, o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

### **Precauciones**

No aplicar en los ojos.

Dado el elevado poder de penetración de ciclopirox olamina se recomienda evitar la administración intensiva y prolongada durante el **primer trimestre del embarazo y la lactancia**.

### **Interacciones**

No se han descrito.

### **Efectos secundarios**

Pueden aparecer en pacientes hipersensibles síntomas de irritación local, sensación de quemazón y picor, normalmente moderados y transitorios, que no suelen determinar la suspensión del tratamiento y que son más frecuentes durante los primeros días de su aplicación.

### **Intoxicación y su tratamiento**

Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento, e instaurar la terapia apropiada. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.



## **Presentación**

*Ciclochem crema*

Envases conteniendo 30 g de crema.

Envases conteniendo 60 g de crema.

## **Otras presentaciones**

*Ciclochem solución*

Envases conteniendo 30 ml de solución.

*Ciclochem crema vaginal*

Envases conteniendo 40 g de crema vaginal.

*Ciclochem polvo*

Envases conteniendo 30 g de polvo.

*Ciclochem uñas*

Envases conteniendo 3 g de solución.

## **Con receta médica**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños**

**Laboratorios Novag, S.A.**

Gran Vía Carlos III, 94

08028 Barcelona (España)

Dir. Técnico: R. Canela